Industriestrasse 30, Postfach, 5036 Oberentfelden
Fon 062 737 50 40, Fax 062 737 50 30
www.vital-ag.ch, info@vital-ag.ch
CHE-106.923.607 MWST

Bien nourrir les truies allaitantes

La phase d'allaitement représente un grand défi. Les truies doivent donner beaucoup de lait sans perdre plus de 10% de poids net. Leur fertilité en dépend. Il est donc impératif de les préparer à cette phase à l'aide d'un aliment d'allaitement très digestible.

Pour donner suffisamment de lait, la truie doit manger et boire beaucoup. Elle ne peut le faire que si elle est en bonne santé et se sent bien. Si on lui présente un aliment appétible, elle le mangera volontiers.

7 MJ d'énergie digestible par jour, par porcelet

Alors que la truie a besoin d'environ 1 MJ d'énergie digestible porc (EDP) par 10 kg de poids et par jour, pour elle-même, il lui faut environ 7.2 MJ par kg de lait produit. Si on vise un poids au sevrage de 8 kg par porcelet, en 28 jours de lactation, pour un poids à la naissance de 1.3 kg, chaque porcelet a besoin d'environ 28 litres de lait.

Besoins nutritionnels élevés; capacité d'ingestion limitée

Les besoins d'entretien d'une truie de 240 kg ne se différencient guère de ceux d'une truie de 180 kg (450 g/jour). Mais pendant l'allaitement, c'est le nombre de porcelets à la mamelle qui détermine les besoins. Le tableau 1 présente les besoins d'une truie de 240 kg dont les porcelets pèsent en moyenne 8 kg au sevrage, le 28e jour de vie.

La capacité d'ingestion est déterminante en phase de lactation. La quantité d'aliment nécessaire augmente dès la mise bas et pendant environ 2 semaines. L'appétibilité, la digestibilité et la concentration énergétique de l'aliment d'allaitement sont donc extrêmement importantes. Celui-ci doit contenir un mélange équilibré de différentes matières premières très appétibles.

Si on se concentre uniquement sur la densité énergétique, on court le risque de prendre des décisions inappropriées. Ainsi, pour une ingestion alimentaire quotidienne de 5 kg, une différence de 0.5 MJ par kg d'aliment signifie 2.5 MJ par animal. Un aliment en farine appétible, à 13.5 MJ/kg, compense déjà ces 2.5 MJ avec moins de 200 g! Par ailleurs, la gestion de l'alimentation, par exemple trois repas quotidiens en périodes chaudes, joue aussi un rôle essentiel.

Une bonne lactation commence en phase de gestation

Une truie en lactation doit-elle être nourrie ad libitum? „Pas tout à fait", car toutes les truies ne supportent pas autant d'aliment; le tractus digestif doit être préparé et présenter une flore microbienne saine. Cette flore est partiellement „contrôlée" via les matières premières ou, par exemple, les bactéries lactiques. Mais cette étape nécessite beaucoup de temps et doit déjà avoir lieu durant la phase de gestation.

	10 porcelets	12 porcelets	14 porcelets
Energie par jour (MJ EDP)	90 - 95	100 - 115	115 - 125
Aliment par jour (kg) pour 13.5 MJ/kg	6.7 – 7.0	7.4 – 8.5	8.5 - 9.2

Tableau 1: besoins énergétiques quotidiens d'une truie de 240 kg, pour un poids de 8 kg par porcelet sevré

La gestion de l'alimentation et l'obser-vation sont essentielles

Après la mise bas, la truie a faim et surtout soif. Il faut donc lui donner assez d'eau et, avec prudence, 2.0 à 2.5 kg d'un aliment appétible. Les truies qui ne mangent pas doivent être immédiatement examinées. Si elles sont en bonne santé, on peut les appâter à l'auge, avec des fruits ou des herbes aromatiques.
Ensuite, on les nourrit de manière ciblée en augmentant tous les jours leur ration d'aliment d'environ 0.3 à 0.5 kg. L'expérience montre que les truies mangent souvent trop vers le 7e jour. Pour éviter cela, stabilisez la quantité d'aliment pendant 2 à 3 jours dès le cinquième jour.

L'observation du comportement alimentaire est fondamental. La truie a-t-elle mangé toute sa ration avant son repas suivant? Même un petit reste a une signification. Quelle pourrait en être la cause? Que va-t-il se passer si on ne change rien? S'il s'agit d'une seule truie, le problème vient probablement d'elle-même. Il se peut que le syndrome MMA soit sur le point d'apparaître. Il faut examiner la truie et éliminer la cause. Le fait que plusieurs truies mangent mal indique plutôt une cause environnementale. Dans ce cas, il convient de vérifier la température ambiante, l'aération, l'alimentation et notamment les installations etc. Si la cause reste mystérieuse, il peut être utile de demander l'aide d'une tierce personne.

Les truies maigres mangent souvent très bien et beaucoup, en particulier lorsqu'elles sont en 2e et 3e lactations. Elles peuvent recevoir davantage d'aliment. Il importe d'observer attentivement les fèces. Si elles sont en bouillie et dégagent une odeur désagréable dans la porcherie, il faut immédiatement réduire la ration alimentaire.

Photo: de jeunes porcelets réguliers grâce à une bonne gestion alimentaire.

Produits Vital très utiles en phase d'allaitement	
Carnivit 5%	Fournit de l'énergie
Mélange d'herbes 20	Stimule l'appétit et la production laitière
Vital LB-50	Bactéries lactiques régulant la flore intestinale
Porcovit	Régule le tractus digestif
Vitalin	Fournit des substances actives et des vitamines
ProPhorce AC 123	Aide pendant la phase de mise bas