Industriestrasse 30, Postfach, 5036 Oberentfelden
Fon 062 737 50 40, Fax 062 737 50 30
www.vital-ag.ch, info@vital-ag.ch
CHE-106.923.607 MWST

Isovital

Ergänzungsfuttermittel für Kälber bei Gefahr von, während oder nach Verdauungsstörungen (Durchfall)

Zusammensetzung

Huminsäuren (WH 67) , Weizenbollmehl, Maltodextrin, Dextrose, Natriumbikarbonat, Natriumchlorid

Inhaltsstoffe pro kg

Rohasche	54 g
Rohprotein	82 g
Rohfett	7 g
Rohfaser	46 g
Calcium	14.2 g
Magnesium	2.4 g
Natrium	6.2 g
Kalium	2.8 g
Chlorid	9.6 g

Eigenschaften / Wirkung

Huminsäuren des Typs WH 67 (HS-67) bilden auf der Mukosazelle des Darmes einen Schutzfilm. Dieser vermindert die Resorption von toxischen Substanzen, wie sie u. a. als Folge von Infektionsprozessen oder von Schadstoffrückständen aus dem Futter im Verdauungstrakt entstehen. Die in der Mischung enthaltenen Oligosaccharide sind die gleichen, welche schon im Rehydratationsprinzip von Jonovit enthalten sind. Oligosaccharide sind nur schwach osmotisch aktiv und ergänzen sich als Diätetika mit den HS-67 zusammen sehr gut.
Die HS-67 zeigen eine ausgeprägte Fähigkeit zur Adsorption von Eiweisstoxinen, toxischen Rückständen und verschiedenen Schwermetallen. Weil die HS im Darm nicht absorbiert werden, kommt es zur Ausscheidung dieser Verbindungen über den Kot.

HS-67 haben einen positiven Einfluss auf die stark beanspruchten Schleimhäute von Labmagen und Darm, erleichtern den Wiederaufbau nach Verdauungsstörungen und Antibiotikabehandlungen und haben einen günstigen Einfluss auf die Darm- und Labmagenmotorik.

Anwendungsmöglichkeiten

Zur Stabilisierung des Wasser- und Elektrolythaushaltes, bei Gefahr von, während oder nach Verdauungsstörungen (Durchfall) beim Kalb. Unterstützend für den Wiederaufbau der Schleimhaut nach Behandlungen von Labmagenentzündungen und rezidivierenden Tympanien.
Bei Pansentrinkern oder durch chronische Infektionen und langen peroralen Antibiotikakuren entgleisten Magen-Darm Gleichgewichten (sowohl aus der Sicht des Darmmilieus als auch der Darmmotorik).

Anwendung / Dosierung

Je nach Grad der Verdauungsstörung 20 bis 30 g pro 50 kg Kalb und Tag auf 2 Milchmahlzeiten verteilt (1 gestrichener grüner Messlöffel enthält ca. 30 g). Die Behandlungsdauer schwankt zwischen 3 und 7 Tagen.
Kann sowohl in die Milch eingemischt als auch in Kombination mit Rehydratationslösungen (Jonovit) angewendet werden.

Sonstige Hinweise

Es wird empfohlen, vor der Verwendung den Rat eines Tierarztes einzuholen.
Packung unter 25°C, trocken und vor Licht geschützt lagern.

Handelsformen

300 g und 800 g Dosen.
Nur über den Tierarzt erhältlich.

Herstellung / Vertrieb

Vital AG, 5036 Oberentfelden, α CH 31895

Informationsstand

August 2014